

東南亞國家登革熱疫情高於去年同期，前往民眾應落實防蚊措施

資料來源：衛生署疾病管制局
疫情內容來源日期：1 月 24 日

東南亞馬來西亞、越南等國家登革熱疫情高於去年同期，呼籲前往旅遊、探親、經商的民眾應落實防蚊措施

今(102)年截至 1 月 21 日止，已**新增 9 例境外移入登革熱病例**，感染國家分別為印尼 3 例，泰國 2 例，菲律賓、越南、新加坡及緬甸各 1 例。根據國際監測資料顯示，東南亞為我國歷年境外移入病例主要國家，其中**馬來西亞、越南、寮國**等國家，登革熱疫情呈攀升趨勢且高於往年同期，境外移入風險攀升，呼籲寒假及春節連假欲前往東南亞等登革熱高風險地區的旅客及商務人士，應採取防蚊措施，避免感染登革熱。

上週（1 月 15 日至 1 月 21 日）新增 3 例本土登革熱病例，分別為高雄市前鎮區興邦里 38 歲女性、臺南市南區明興里 19 歲男性及中西區大涼里 37 歲男性。101 年自入夏以來，本土登革熱確定病例共 1,264 例，其中臺南市 744 例，高雄市 501 例，桃園縣 7 例，新北市 5 例，臺北市、苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、屏東縣、臺東縣及澎

湖縣各 1 例。**本土登革熱整體疫情持續趨緩，但臺南市與高雄市仍有零星個案發生**，需持續進行孳生源清除等防疫作為，以防止疫情跨冬流行。

世界衛生組織(WHO)於今年 1 月 16 日指出，**登革熱是全球傳播速度最快的蟲媒傳染病**，加上東南亞為我國主要旅遊、探親及經商地點，顯示境外移入登革病毒風險，不容小覷。今年寒假放假天數多達一個月，且春節九天連假即將來臨，民眾出國機會增加，疾管局呼籲寒假或春節期間前往登革熱流行地區時，**務必做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、身體裸露部位塗抹衛生署核可防蚊劑**。回國後如有發燒、頭痛、出疹、後眼窩痛、肌肉痛、關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並告知醫師旅遊史、活動史等相關資訊，以利醫師診療及通報。

印尼、尼泊爾傳動物禽流感疫情，出國旅遊洽公，避免接觸禽鳥

資料來源：衛生署疾病管制局
疫情內容來源日期：1 月 11 日

印尼、尼泊爾近期傳出動物禽流感疫情，呼籲國人出國旅遊洽公，避免接觸禽鳥，降低感染機率

性禽流感疫情，**印尼峇里島**亦傳出鴨隻疑似感染禽流感死亡。**顯示禽流感流行風險仍持續存在**。呼籲國人出國旅遊或洽公時，應加強自我防護，避免接觸禽鳥，降低感染機率。

2012 年世界衛生組織（WHO）累計公布有 32 例**人類 H5N1 流感病例**，分別發生於柬埔寨、埃及、印尼、越南、孟加拉及中國大陸等地，經調查**多數病例有禽鳥接觸史**，其中 20 例死亡。依據世界動物組織（OIE）公布資料，去年全球共有 18 個國家通報 219 起疫情，其中高病原性禽流感發生地區以亞洲的越南、孟加拉共和國、香港、尼泊爾、印度等地，及中南美洲的墨西哥為主。依據 WHO 及世界動物組織（OIE）公布資料，全球自 2003 年迄今人類 H5N1 流感確定病例累計有 610 例，其中 360 例死亡，**致死率將近 6 成**，病例報告國家前三名為**印尼**（192 例，160 例死亡）、**埃及**（169 例，60 例死亡）及**越南**（123 例，61 例死亡），因此國人不可輕忽。

由於人類感染 H5N1 流感的傳染途徑係**經由吸入或接觸口、眼、鼻黏膜**，民眾若出國旅遊洽公時，尤其前往傳出禽流感疫情之地區，應加強自我防護，**避免接觸禽鳥**；出入傳統市場亦應特別注意個人衛生安全，**肉品和蛋類必須完全煮熟再食用**。為防堵禽流感病毒境外移入及避免感染禽流感，民眾切勿走私禽鳥入境。返國時如出現發燒或類似流感症狀，可於機場尋求檢疫人員協助，倘返家後有身體不適，應戴上口罩儘速就醫，並向醫師說明旅遊及接觸史，以利儘速診斷及治療。

臺大醫院感染控制中心關心您

NTU