

## 疫情訊息

### 目前為腸病毒流行高峰期，應正確勤洗手，幼童照顧者注意重症前兆病徵

資料來源：衛生署疾病管制局  
疫情內容來源日期：5月27日

我國已進入腸病毒流行高峰期，國內已累積 4 例腸病毒感染併發重症個案（102.5.21 止），鄰近的中國大陸、香港、日本、韓國的腸病毒疫情亦逐漸上升中。中國大陸今年截至 5 月 5 日累計通報手足口病 382,027 例，重症 2,190 例，死亡 57 例，實驗室診斷病例中有 72% 為腸病毒 71 型。目前國內主要流行腸病毒以克沙奇 A 型病毒為主，其中以克沙奇 A6 型為最多，該型病毒的致病力雖不如腸病毒 71 型嚴重，但仍有引發重症的風險，民眾不可輕忽，應注意防範，出國至中國大陸及東南亞等腸病毒流行區域時，亦應注意落實洗手等防範措施。

疾管局呼籲，腸病毒傳染力強，容易在人口密集且互動密切的場所傳播，家庭及教托育機構常見群聚感染，該局特別提醒教托育機構及嬰幼兒家長，應定期進行環境清潔，兒童常接觸之物品及玩具，應時常清洗消毒，並應教導兒童做好個人衛生，落實正確勤洗手。當兒童生病時，應立即就醫，遵照醫師建議在家休息，並與其他嬰幼兒適度區

隔，生病期間不要到補習班、安親班或其他擁擠的公共場所活動，以降低傳播病毒的機會。

學齡前嬰幼兒為腸病毒重症的高危險群，且重症病程發展快速，只有短短數小時之黃金治療時間，若家中嬰幼兒經醫師診斷感染腸病毒時，應設法與其他幼兒隔離，減少接觸，以降低感染的機會，並注意觀察是否出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌抽躍（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等重症前兆病徵，一旦出現上述任一病徵，請務必立即送至大醫院，掌握治療的黃金時間。

---

## 新型冠狀病毒感染病例仍持續增加中，至中東地區請提高警覺

資料來源：衛生署疾病管制局  
疫情內容來源日期：5月17日

全球自去年4月迄今累計40例新型冠狀病毒感染病例（20例死亡），分別為沙烏地阿拉伯30例（15例死亡）、約旦2例（2例死亡）、英國4例（2例死亡）、德國2例（1例死亡）、法國2例。我國自去年9月迄今，總計通報3名疑似新型冠狀病毒感染病例，經檢驗後均排除感染。另為擴大監視，針對醫院送驗之不明原因肺炎檢體共227件進行檢驗，結果均排除新型冠狀病毒感染。

疾管局呼籲，民眾如果至中東地區，應提高警覺並注意手部清潔（可以肥皂和水或酒精性乾洗手液清潔手部）及咳嗽禮節，同時盡量避免到人群聚集或空氣不流通的地方，勿與有呼吸道症狀者密切接觸。自中東地區入境民眾，如出現發燒或有急性呼吸道症狀，於入境時應主動通報檢疫人員，並配合接受檢疫及後送就醫作業，進行採檢與醫學評估；入境返家後如出現發燒或有急性呼吸道症狀，則應佩戴一般外科口罩儘速就醫治療，並主動告知醫護人員旅遊史。

臺大醫院感染控制中心關心您