

疫情訊息

為避免感染狂犬病，勿接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷應儘速就醫

資料來源：衛生署疾病管制局
疫情內容來源日期：7月18日

為避免感染狂犬病，勿接觸野生動物，如遭野生動物抓咬傷應儘速就醫

因應國內野生動物之狂犬病疫情，疾管局提醒民眾：應避免接觸或豢養來源不明的野生動物，如遭動物抓咬傷，請立即以肥皂及大量清水清洗傷口 15 分鐘，再以優碘或 70%酒精消毒後儘速就醫，由醫師評估並進行必要的醫療處置，以降低感染風險。

國內狂犬病疫苗接種建議：（102.7.17 衛生署傳染病防治諮詢會議）

1. 如於國內動物狂犬病發生的三個鄉鎮（南投縣魚池鄉及鹿谷鄉、雲林縣古坑鄉）及其他山地鄉，遭受野生哺乳類動物、流浪犬貓抓咬傷，請立即就醫並自費接種疫苗。
2. 於國內動物狂犬病發生的三個鄉鎮（南投縣魚池鄉及鹿谷鄉、雲林縣古坑鄉）及其他山地鄉，如有家犬或家貓出現疑似狂犬病症狀，飼主應立即向當地鄉鎮公所及衛生單位通報。經主管機關評估確有風險後，建議飼主自費接受狂犬病暴露後疫苗接種。
3. 於全國其他地區遭受野生哺乳類動物（不含流浪犬貓）抓咬傷，建議立即就醫並自費接種疫苗。
4. 於全國其他地區遭受無症狀家犬/貓或疫區外流浪犬/貓抓咬傷，感染狂犬病的風險極低，建議不須接種疫苗。

日本腦炎正值流行高峰期，家中嬰幼兒應完成疫苗接種，個人應做好防蚊措施

資料來源：衛生署疾病管制局
疫情內容來源日期：7月12日

日本腦炎病例持續增加，正值流行高峰期，呼籲民眾儘速攜家中嬰幼兒完成疫苗接種，並做好個人防蚊措施

疾管局公布新增 5 例日本腦炎確定病例，年齡為 32 歲至 60 歲之間，4 名男性、1 名女性，皆於 6 月 10 日至 6 月 30 日間發病，分別居住於台南市東區、雲林縣台西鄉、台中市太平區、新竹縣新豐鄉及高雄市鳳山區，其中 1 例未曾接種過疫苗，其餘 4 例接種史不明，仍有 4 名住院治療中、1 名出院。新增確定病例居住地已不僅限於中南部，全台民眾需提高警覺，加強個人防蚊措施，以避免感染。本（102）年累計至 7 月 9 日止，共 9 名確定病例，其中居住於南區及高屏區各 3 例、2 例居住於中區、1 例居住於北區。

每年 5 月至 10 月為日本腦炎流行期，6 月至 7 月為流行高峰期，經調查確定病例居住地或活動週遭環境發現，以有水稻田、養豬戶及養鴿戶為前 3 大高風險生態環境，該環境亦為病媒蚊易孳生場所，且為天然宿主（豬）之集中地，呼籲上述高風險環境者的民眾，應特別注意自我防蚊措施。為防止疫情擴散，衛生單位已於確定病例住家或活動地附近之高風險環境懸掛捕蚊燈誘捕病媒蚊，並加強周邊住戶之衛教宣導及適齡兒童之常規疫苗催種工作。

疫苗接種為預防日本腦炎感染之最有效的方法，家中如有未完成疫苗接種之適齡嬰幼兒，應儘速帶領前往轄區衛生所或指定醫療機構完成接種，以避免感染，造成嚴重的後遺症，目前各地衛生所全年均提供接種服務。成人如自覺有感染之虞，亦可前往署立醫院或其分院、臺大醫院雲林分院及新竹分院等指定醫院自費接種，一劑疫苗接種收費約介於 150-500 元之間。

感染日本腦炎初期的症狀與感冒類似，主要為發燒、頭痛、噁心、嘔吐等，惟嚴重者後續可能出現抽筋、頸部僵硬，甚至昏迷或死亡，病患通常預後不佳，常留有需長期治療之後遺症，如肌肉張力不正常、語言障礙、性格異常、智力失常等。該局呼籲民眾如居住地或活動地有豬舍、水稻田、鴿舍等高風險生態環境者，應儘量避免在黃昏與黎明時於上述地點活動；若無法避免，應穿著淺色長袖衣褲，並於身體裸露處塗抹衛生署核可之防蚊藥劑，以避免蚊蟲叮咬。

臺大醫院感染控制中心關心您