

疫情訊息

國內流感疫情下降，但仍在疫情高峰，民眾勿掉以輕心

資料來源：衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期：2017 年 7 月 25 日

疾病管制署表示，國內流感輕症疫情連續 3 週下降，另流感併發重症通報及確診病例也連續 2 週下降；惟流感就診人次仍多，且持續有重症病例出現，整體疫情仍在流行高峰。疾管署副署長莊人祥 7 月 4 日引用香港中文大學分析天氣和流感病毒關係的研究指出，氣溫超過 20 度時，如果相對溼度維持於 70% 以下，不利病毒生長，但只要溼度上升，病毒又會活躍，造成夏季流感高峰。提醒民眾勿輕忽類流感症狀，如出現重症危險徵兆請儘速就醫，以降低併發重症風險，並請持續保持良好的手部與呼吸道衛生，及落實生病在家休息。

疾管署監測資料顯示，上週（7 月 16 日至 7 月 22 日）就診人次為 106,005 人次，較前一週（115,987 人次）下降 8.6%，已連續 3 週下降；上呼吸道/類流感群聚通報案件 26 起，近 3 週通報數持平，但較 6 月中下旬每週新增通報數低，其中流感檢驗陽性 16 起，發生地點以人口密集機構（12 起）為主。實驗室監測資料顯示，社區流行病毒型別以 H3N2 為主，B 型流感僅占檢出流感病毒約 9%，近 4 週抗原性監測資料顯示 95% H3N2 病毒與本流感季疫苗株吻合。

上週新增 101 例流感併發重症確定病例，確定病例新增數連續 2 週下降，個案感染型別以 H3N2 為多；另新增 13 例重症死亡病例，發病年齡介於 54 歲至 96 歲，均有慢性病史，感染型別為 11 例 H3N2 及 2 例 B 型。2016 年 7 月 1 日迄今累計 1,194 例流感併發重症確定病例，其中 121 例死亡。目前流感輕症疫情已過最高點，呈現下降趨勢，依歷年疫情走勢，重症新病例數預期將隨著輕症疫情趨緩後逐漸下降。

公費流感抗病毒藥劑擴大使用條件適用期間延長至 7 月 31 日，疾管署再次呼籲，民眾如有類流感症狀，請至鄰近公費流感抗病毒藥劑合約診所就醫，避免集中至大醫院急診，凡經醫師判定符合公費用藥使用條件，不需快篩，均可依規定使用公費抗病毒藥劑；但如出現呼吸困難、急促、發紺（缺氧）、血痰或痰液變濃、胸痛、意識改變、低血壓等流感危險徵兆者，則應儘速至大醫院接受治療。

～臺大醫院感染管制中心關心您～

全國今年已累計 19 例日本腦炎確定病例，請民眾加強防蚊與按時接種疫苗

資料來源：衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期：2017 年 7 月 7 日、7 月 24 日

現處日本腦炎流行季，全國今年截至目前已有 19 例確定病例，再次籲請民眾提高警覺，加強落實防蚊及接種疫苗等措施，以降低感染風險。

國內今年 19 例日本腦炎確定病例分別為高雄市、彰化縣各 3 例，屏東縣、桃園市、嘉義縣、台南市及新北市各 2 例，南投縣、花蓮縣及新竹市各 1 例。近 5 年同期個案數介於 13 至 28 例之間，近年各縣市多曾出現確定病例，雖多為散發病例，惟各年齡層都有感染風險，主要為 40 歲以上成人為主，民眾不能掉以輕心。

患者感染日本腦炎後大多無症狀，少數會有頭痛、發燒或無菌性腦膜炎等症狀，嚴重則可能出現急性腦炎、精神、神經性後遺症，甚至死亡。接種疫苗為最有效的預防方法，住家或活動場所鄰近豬舍、水稻田等高風險環境或自覺有感染風險的民眾，可至衛福部部立醫院等醫療院所自費接種疫苗；家中適齡嬰幼兒如未完成疫苗接種，也應儘速帶往鄰近衛生所或指定醫療院所完成接種，以避免感染及衍生嚴重後遺症。

臺灣以三斑家蚊為日本腦炎主要病媒蚊，常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處。疾管署再度呼籲，民眾應儘量避免於黃昏、黎明等病媒蚊吸血高峰，在豬舍、其他動物畜舍或病媒蚊孳生地等處附近活動，如果無法避免應穿淺色長袖衣褲，並於身體裸露處使用衛福部核可的防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬感染；如有疑似症狀請儘速就醫接受治療。

～臺大醫院感染管制中心關心您～