

疫情訊息

流感疫情持平，仍須落實防護並加強手部衛生與咳嗽禮節

資料來源：衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期：2018 年 2 月 21 日

疾管署監測資料顯示，國內上週（2 月 11 日至 2 月 17 日）類流感門急診就診人次共 110,130，整體疫情與前一週持平。

上週新增 59 例流感併發重症確定病例，其中 50 例未接種本季流感疫苗；另新增 4 例流感死亡個案（3 例 B 型、1 例 H3N2），4 例有慢性病史，2 例未接種本季流感疫苗。本流感季自去（2017）年 10 月 1 日起累計 430 例流感併發重症確定病例，其中 58 例經審查為流感相關死亡病例（49 例 B 型、5 例 H3N2、3 例 H1N1、1 例 A 未分型）；確定及死亡病例感染型別均以 B 型為多，約占 8 成。

疾管署再次呼籲，民眾應落實勤洗手、有呼吸道症狀戴口罩，儘量避免出入人潮擁擠、空氣不流通的公共場所，以及生病在家休息等，避免流感病毒傳播。如出現類流感症狀，可就近至國內 4 千多家公費藥劑合約醫療機構就醫，凡經醫師臨床判斷判定符合公費流感抗病毒藥劑用藥條件，不需快篩，就能使用公費藥劑。

～臺大醫院感染管制中心關心您～

國內發生 2 起狂犬病陽性鼬獾咬傷人事件，請民眾勿接觸野生動物，不慎遭抓咬傷請儘速就醫

資料來源：衛生福利部疾病管制署

疫情內容來源日期：2018 年 2 月 21 日

疾病管制署公布今（2018）年國內首 2 起鼬獾咬傷民眾事件，且鼬獾檢體經農委會家畜衛生試驗所檢驗均確認為狂犬病陽性。2 名傷者分別居住在臺南市關廟區及花蓮縣光復鄉，於本（2）月 17 日、18 日遭闖入的鼬獾咬傷，2 名傷者均已就醫無不適症狀，衛生單位將協助傷者依時程完成後續狂犬病疫苗接種，並進行健康關懷。

疾管署表示，國內每年均有數起鼬獾抓咬傷民眾案件，去（2017）年全年有 18 起，其中 13 件檢驗為狂犬病陽性、1 件陰性、4 件未送驗，分布範圍為花蓮縣及南投縣各 3 件，臺南市、嘉義縣及臺東縣各 2 件，屏東縣 1 件。另國內自 2002 年迄今累計 3 例人類感染狂犬病確定病例，均為境外移入，分別為 2002 年及

2012 年各有 1 例，感染地為中國大陸、2013 年 1 例，感染地菲律賓，均已死亡。

疾管署指出，狂犬病是由狂犬病病毒引起的一種急性腦脊髓炎，潛伏期約 1 至 3 個月，初期症狀有發熱、喉嚨痛、發冷、厭食、嘔吐、呼吸困難、咳嗽、頭痛或咬傷部位異樣感，數天後出現興奮及恐懼現象，然後麻痺、吞嚥困難，咽喉部痙攣，並引起恐水現象（又稱恐水症），隨後會發生精神錯亂及抽搐等情況，如不採取醫療措施，患者常因呼吸麻痺導致死亡，致死率近 100%，但如能在遭動物咬傷後及時就醫，並接受狂犬病暴露後預防接種，可以降低發病的風險。

疾管署再度提醒，民眾應避免接觸及捕捉野生動物（包括蝙蝠），每年須帶家中犬、貓寵物等施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物或流浪犬貓抓咬傷，請以肥皂及大量清水沖洗傷口 15 分鐘，再以優碘或 70%酒精消毒後，儘速前往「人用狂犬病疫苗接種服務醫院」（[參疾管署網站](#)）就醫，經醫師評估如有感染狂犬病風險，應儘速接種免疫球蛋白，並依時程（接種第一劑當天為第 0 天，及第 3、7、14、28 天）接種 5 劑人用狂犬病疫苗，降低發病風險。

～臺大醫院感染管制中心關心您～