

常見用藥 Q&A

內容下載：



問題： 哪些人能使用克流感？怎麼吃？使用時有什麼要注意的？

回覆： 克流感 (Tamiflu) 或易剋冒 (Eraflu) 學名均為 oseltamivir ，二者成分相同，不同藥廠製造。衛福部核准的相關適應症為成人和兒童 (包含足月新生兒) 的流行性感冒之治療。也可以做為成人和 1 歲或以上兒童的流行性感冒之預防。此藥品可以有效抑制病毒在人體細胞內快速複製後被釋放出來，進而讓身體的免疫系統能更快將流感病毒去除。

公費使用族群

為避免疾病傳播及衍生重症的可能性，衛福部提供特別族群公費使用這類藥品。以下列出衛福部規定可以使用公費克流感 (抗病毒製劑) 的族群。必須注意的是，並非不符合這些

條件的病人就不能使用。在有特殊狀況或是在醫師專業判斷之下仍可自費使用克流感。

1. 「流感併發重症」通報病例
2. 「新型 A 型流感」通報病例
3. 孕婦經評估需及時用藥者 (領有國民健康署核發孕婦健康手冊之婦女)
4. 未滿 5 歲及 65 歲以上類流感病人
5. 確診或疑似罹患流感住院 (含急診待床) 病人
6. 具重大傷病、免疫不全 (含使用免疫抑制劑者) 或流感高風險慢性疾病的類流感病人
7. 肥胖 (BMI \geq 30) 的類流感病人

成人/兒童常見劑量及療程

成人最常見的使用方式為一天兩次，一次一顆膠囊 (75 毫克 / 顆)，少數腎功能不全的病人會依據個別腎功能調整劑量。

兒童通常也是一天兩次，使用劑量依體重而定。療程通常為五天，必須完成療程才能有完整的治療效果。若是預防性投藥的話，成人使用方式通常為一天一次，一次一顆，療程為

十天。

注意事項

1. 常見副作用：偶有頭暈喉痛，噁心、嘔吐，但與感冒症狀類似，並不嚴重。曾有零星個案報導在服用藥品後產生精神狀態異常，但目前資料尚未確定直接的因果關係，無須過度擔心。
2. 藥品儲存：藥品放置在常溫（低於 25°C）即可。兒童在使用克流感時，基本上會將膠囊打開，製作成水劑方便兒童服用。泡製後應將藥品置於低溫環境下（2-8°C，使用期限自加水調配日算起 14 日內）儲存以維持藥品的穩定性。

參考資料

1. 臺大醫院藥劑部(2019)。臺大醫院處方集。台北市：臺大醫院藥師
2. Drug information: Oseltamivir. In: UpToDate, Post TW (Ed), UpToDate, Waltham, MA. (Accessed on

March 6, 2020.)

3. Micromedex® 2.0, (electronic version). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA.

Available <http://www.micromedexsolutions.com/>

4. 公費流感抗病毒藥劑使用對象一覽

表 <https://www.cdc.gov.tw/Category/Page/fHHHNV-HWYyD00tnKeXsLA>

藥劑部藥師 黃崧博