

疫情訊息

東帝汶及模里西斯爆發本土疫情，即日起自低風險調整至中低風險國家/國內出現今年首例傷寒本土病例/清明連假掃墓出遊請做好防蟲措施，防範恙蟲病/防範登革熱平時做好巡、倒、清、刷

- 新冠肺炎：東帝汶及模里西斯爆發本土疫情，即日起自低風險調整至中低風險國家。
- 傷寒：國內出現今年首例傷寒本土病例，呼籲民眾避免生飲生食並留意手部衛生。
- 恙蟲病：恙蟲病歷年通報數自 4 至 5 月開始呈現上升，清明連假民眾掃墓或出遊請做好防蟲措施。
- 登革熱：今年登革熱病例均為境外移入，仍不可輕忽，平時落實「巡、倒、清、刷」，將積水容器倒掉。

新冠肺炎

資料來源：疾管署網站 2021-03-31

疫情摘要

全球累計 127,993,949 例確診，分布於 193 個國家/地區；病例數排序以美國、印度、巴西、俄羅斯及英國為多，截至 3 月 29 日國內累計 1024 例確診。

建議

東帝汶近期爆發本土疫情，當局已宣布進入緊急狀態，關閉國界並限制跨行政區移動；模里西斯上週出現首例本土病例，其接觸者陸續確診，並已造成第二波感染；故即日起該 2 國自低風險國家調整為中低風險國家。

傷寒

資料來源：疾管署網站 2021-03-09

疫情摘要

國內今年確診首例傷寒本土確定病例，為居住中部 10 多歲女性，2 月 2 日起陸續出現發燒、腹痛、腹瀉等症狀，因高燒不退住院治療，出院後因持續發燒、咳嗽、腹痛、嘔吐、腹瀉等症狀再度就醫，3 月 2 日因症狀未緩解轉院治療並採檢，經驗出傷寒桿菌陽性確診。同住家人及校園接觸者均無疑似症狀，衛生單位正調查個案飲食史及接觸史以釐清可能感染來源，由於個案潛伏期間無國外旅遊史，初步研判為國內感染。

建議

傷寒為由傷寒桿菌引起之腸胃道傳染病，潛伏期約 8 至 14 天(可由 3 至 60 天不等)，傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。

預防方法：食物充分煮熟並以熱食為宜、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，

落實良好衛生習慣，飯前便後一定要落實手部衛生，才能有效防範。

恙蟲病

資料來源：疾管署網站 2021-03-16

疫情摘要

疾管署監測資料顯示，今年截至 3 月 15 日累積 27 例，其中花東地區感染個案 12 例；我國全年皆有恙蟲病病例，歷年通報數自 4 至 5 月開始呈現上升，6 至 7 月達高峰，於花東及離島地區感染病例數較多。

建議

恙蟲病是由帶有立克次體的恙蟎叮咬而傳染，恙蟎會停留於草叢中，伺機攀附到人類或動物身上。潛伏期約 9 至 12 天，患者會出現持續性高燒、頭痛、淋巴結腫大等症狀，約發燒一週後皮膚出現紅色斑狀丘疹，叮咬處通常會出現焦痂，是此疾病的重要特徵。

若接觸到草叢環境，建議穿著淺色長袖衣褲保護，於皮膚裸露部位使用政府機關核可含敵避 (DEET) 或派卡瑞丁 (Picaridin) 成分的防蚊藥劑。此外，離開草叢後儘快沐浴及換洗全部衣物，避免恙蟎附著叮咬。

登革熱

資料來源：疾管署網站 2021-03-16

疫情摘要

今年登革熱病例累計 3 例，均為境外移入，分別自菲律賓、柬埔寨及越南移入，尚無本土病例。近期國內降雨量雖不多，但由於孳生源與民眾生活習慣息息相關，蚊蟲喜歡棲息於草叢、積水容器及陰暗角落等，仍不可輕忽登革熱等蚊媒傳染病威脅。

建議

請巡視家戶內外積水容器，落實「巡、倒、清、刷」，將輪胎、鐵鋁罐、帆布、寶特瓶、盆栽墊盤等積水容器澈底清除。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等症狀，應儘速就醫，並主動告知活動史。

～臺大醫院感染管制中心關心您～