

疫情訊息

社區疫情急升，請提高警覺，落實手部衛生及佩戴口罩等個人防護措施

新冠肺炎

1. 社區疫情急升，請民眾提高警覺，落實手部衛生及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域。
2. 為提供學齡前兒童(6 歲以下)優先照顧，舒緩醫院急診量、避免過多就診者排擠兒童之待診時間，以及減少群聚，四大公立醫療體系設置學齡前兒童就醫綠色通道，名單詳參 [05/13 新聞稿](#)。本院親子疫病門診資訊詳參 [兒童醫院網站最新消息](#)。
3. 衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)2022 年第 3 次會議決議，建議下列對象接種第一次追加劑間隔 5 個月後，可接種第二次追加劑，並自 5/16 起實施：65 歲以上長者、長照機構住民、18 歲以上免疫不全及免疫力低下且病情穩定者(即建議接種基礎加強劑之對象)。更多資訊詳參 [05/14 新聞稿](#)。

4. 現階段我國 COVID-19 疫情已進入社區流行，雖目前流行之 Omicron 變異株以輕症為主要表現，但年長者及有潛在疾病患者，轉變為重症或死亡之風險較高。COVID-19 專家諮詢會統整最新實證治療資訊，詳參[新型冠狀病毒 SARS-CoV-2 感染臨床處置指引第十八版](#)。(資料來源：疾病管制署致醫界通函第 479 號)

不明原因肝炎

資料來源：疾病管制署致醫界通函第 476 號

英國、美國及歐洲、中東地區與亞洲等部分國家近期陸續出現多起兒童嚴重不明原因急性肝炎病例，疾病管制署籲請醫師提高警覺，如有兒童患者出現急性肝炎症狀且實驗室檢驗排除 A、B、C、D、E 型別肝炎病毒感染時，請加強通報「急性病毒性肝炎未定型」。

依據 WHO、歐洲疾病預防控制中心 (ECDC) 資料顯示，截至 4 月 21 日，累計 169 例確定病例，其中英國 114 例、西班牙 13 例、以色列 12 例及美國 9 例，另丹麥、義大利、荷蘭、愛爾蘭、法國、挪威、比利時及羅馬尼亞等國亦報告類似病例，且鄰近國家日本近期亦報告有 1 例疑似個案。病例多小於 10 歲，具黃疸及腹瀉、嘔吐和腹痛等胃腸道症狀，大部分個案無發燒，部分個案症狀嚴重，

其中 17 人須肝臟移植，1 例死亡。

地方性斑疹傷寒

資料來源：疾病管制署致醫界通函第 477 號

高雄港於 111 年 3、4 月及臺中港於 3 月在野鼠間發現有地方性斑疹傷寒血清抗體陽性情形，依據國內長期監測資料分析顯示當動物血清抗體陽性率愈高，1、2 個月後的本土個案發生率愈高。

地方性斑疹傷寒屬蚤媒人畜共通傳染病，不會直接由人傳染給人，潛伏期 1~2 週（通常為 12 天），依國內監測資料，全年各月皆可能有病例發生，平均每年約有 30 例本土個案通報確診，個案多集中在臺南、高雄、屏東及臺中、彰化、雲林，尤好發於 5~7 月，本次血清抗體陽性的野鼠檢出地亦位處或鄰近該等地區。地方性斑疹傷寒臨床表現多元且特異性低，較易忽略，惟其可經藥物有效治療，如儘早及時給予抗生素，可有效降低重症風險，因此對於疑似個案，無須等候實驗室檢驗結果，即可依臨床診斷優先投藥治療。除 COVID-19 外，疾管署籲請醫界朋友近期留意具前述地區蚤叮咬史或動物接觸史病患，警覺可能為疑似病例，及時診治並通報，以防範疾病重症及擴散。

人類免疫缺乏病毒(愛滋病毒)感染

資料來源：疾病管制署新聞稿(2022/05/20)

為鼓勵民眾瞭解自身健康狀況，疾管署今(2022)年持續辦理「愛滋自我篩檢計畫」，截至 4 月底止已提供 1 萬 9,000 多人次篩檢服務，計畫受到廣大迴響。民眾可上網預訂，選擇鄰近超商通路(7-ELEVEN 或全家)，支付 200 元試劑費及 45 元物流費取得愛滋自我篩檢試劑；或前往合作民間團體、衛生局(所)等 427 個實體服務點，或利用 54 臺自動服務機，支付 200 元費用後取得篩檢試劑，進行自我篩檢，兼顧隱私與便利性，相關服務內容及試劑提供地點資訊可至疾管署自我篩檢計畫網頁查詢。

猴痘

資料來源：疾病管制署致醫界通函第 480 號

世界衛生組織(WHO)公布歐洲、美洲及大洋洲等非屬猴痘流行國家疫情資訊，111 年 5 月 13 日迄今，已累計 11 國新增 87 例確定病例及 28 例疑似病例，確定病例中以英國 29 例、葡萄牙及西班牙各 23 例為多，且不排除當地發生罕見本土傳播疫情。猴痘疫情過去多發生於西部及中部非洲地區，其他國家僅偶爾發生零星的境外

移入病例。目前透過 PCR 確診之病例樣本均為西非分支猴痘病毒，個案多出現發燒、皮疹、頭痛等症狀，部分亦出現生殖器感染情形，尚無死亡報告。疾管署籲請醫界朋友提高警覺，遇有具皮膚病灶，且有猴痘確定病例報告之國家旅遊史、野生動物/非洲特有外來種動物（含屍體）暴露史之可能為疑似病例，請加強通報。

因猴痘可能透過接觸感染源的傷口、體液、呼吸道分泌物等方式傳播，故建議醫院照護疑似或確定病例時依循標準防護措施、接觸傳染防護措施及飛沫傳染防護措施。採檢/醫療照護人員建議穿戴手套、隔離衣、醫用口罩、護目裝備(護目鏡或全面罩)；如果病人情況允許，其他人與病人近距離(小於 1 公尺)接觸時，建議病人佩戴醫用口罩。

～臺大醫院感染管制中心關心您～