

## 常見用藥 Q&A

問題：

配合膀胱鏡檢查，醫師所開的單顆

cephalexin 膠囊應於何時服用？

回覆：針對檢查或手術部位有感染風險的病人，在進行

斷性膀胱鏡檢查時會建議給予抗生素作為預防使

用，根據不同可能出現的菌種及高風險感染部位，

給予的預防性抗生素種類也會有所不同。原則上，

口服的預防性抗生素應於檢查前約 1 小時服用，而

注射的預防性抗生素則應於檢查前約 30 分鐘給予注

上述問題中的 cephalaxin 膠囊屬於口服抗生素，

於檢查前 1 小時服用。

### 參考資料

1. Cynthia s fok, md, mph, & Kimberly ken

md, ms, facog, facs. (2022, July 7).

Diagnostic Cystourethroscopy (Cystoscopy) for Gynecologic Conditions.

UpToDate. <https://www.uptodate.com/contents/diagnostic-cystourethroscopy-cystoscopy-for-gynecologic-conditions>

2. Zeng, S., Zhang, Z., Bai, Y., Sun, Y., & Xu, C. (2019). Antimicrobial agents for preventing urinary tract infections in adults undergoing cystoscopy. Cochrane Database of Systematic Reviews, (2).
3. European Association of Urology. (2018). Guidelines on urological infections. 2015. URL: [https://uroweb.org/wpcontent/uploads/19-Urological-infections\\_LR2.pdf](https://uroweb.org/wpcontent/uploads/19-Urological-infections_LR2.pdf).

藥劑部藥師 邱家柔

